


## CERATOPOGONIDI

**D**ella famiglia Ceratopogonidae i generi *Culicoides*, *Leptoconops*, *Ceratopogon* e *Lasiohelea*.

Ecco dei nomi impronunciabili che ci portano a numerose specie di ditteri di piccole dimensioni (1/3 millimetri), scuri, le cui femmine sono ematofaghe (si nutrono di sangue).

Ci interessiamo a loro perché provocano delle vistose reazioni cutanee che permangono per più giorni e che, grazie al fatto che quanto le larve si sviluppano nel fango e nella sabbia (del genere *Leptoconops* vale ricordare le specie *Irritans*, *Bezzii*, *Kertezzi*) ed al vento che li trasporta, ce li ritroviamo in varie località balneari.



Culicoide (*Culicoides*): A) adulto; B) larva.


estratto da "Guida alla Disinfestazione" di Augusto Scirocchi CESI 1988.

## TRIPIDI

**I**Thripidae sono insetti (ordine dei tisanotteri) di colore scuro e con quattro strette ali che si distinguono per una frangia di ciglia lungo i bordi.

In genere succhiano la linfa delle piante ma quando scarseggia il loro cibo attaccano l'essere umano e succhiano il suo sangue.

La specie che più comunemente attacca l'essere umano è il *Limothrips cerealium* e che misura 1,5 millimetri.



*Limothrips cerealium*.

"dalla Guida alla Disinfestazione di Augusto Scirocchi CESI 1988"

## TAFANI

**T**abanidae, le specie di questa famiglia hanno le femmine ematofaghe e hanno una robusta corporatura simile alla mosca.

**Il suggerimento del**  
Dott. Gianfranco Bronchi - Firenze

Avendo i camperisti un frigorifero a bordo possono dotarsi di una fiala di siero antiofidico da consegnare, in caso di emergenza, al Presidio medico eventualmente sprovvisto.